

代数拓扑——左岸孤单人

Chern Class 凯森森

在本笔记中，我们遵循如下记号：

- \cong : 拓扑空间间的同胚；
- \simeq : 拓扑空间之间的同伦等价；
- $A \setminus B$: A 与 B 的差；
- A/B : A 商去 B ；
- S^n : n 维单位球面；
- D^n : n 维闭单位球；

重点回顾的题目：2.2.8, 2.6.10-2, 2.6.16-9/10, 2.7 节应用矩阵初等变换转化伦型的问题 (不能将具体例子和算法对应起来)

目录

1 拓扑空间的同胚型	2
2 拓扑空间的同伦型	7
3 同调计算——泛系数定理	10
3.1 张量积与 Tor 的运算	10
4 同调计算——单纯同调与胞腔同调	11

1 拓扑空间的同胚型

定理 1.1. 关于一点紧化, 有如下基本事实:

- 任何 Hausdorff 空间均可定义其一点紧化空间;
- 紧空间 X 的一点紧化空间为 X 和一点的不交并, 也即 $X \sqcup *$;
- $(\mathbb{R}^n)^* \cong S^n$, 同理 $S^n \setminus * \cong \mathbb{R}^n$;
- 一个十分常用的等式 (同时添上/减去一点):

$$A^* \setminus B^* = A \setminus B.$$

定理 1.2. 关于乘积空间的边界, 我们有

$$\partial(A \times B) = (A \times \partial B) \cup (\partial A \times B),$$

也即满足“Lebniz 法则”.

Problem 1. 对于 $m, n \geq 0$, 我们有同胚

$$S^{m+n+1} = D^{m+1} \times S^n \cup S^m \times D^{n+1}.$$

证明 利用定理 1.2. □

Problem 2. 对于 $m > 0$ 和 $n \geq 0$, 我们有同胚

$$\mathbb{R}^{m+n} \setminus \mathbb{R}^n \cong S^{m+n} \setminus S^n \cong \mathbb{R}^{n+1} \times S^{m-1}.$$

证明 第一个同胚: 利用定理 1.1, 则

$$\mathbb{R}^{m+n} \setminus \mathbb{R}^n = (S^{m+n})^* \setminus (S^n)^* = S^{m+n} \setminus S^n.$$

第二个同胚: 利用乘积空间做差:

$$\mathbb{R}^{m+n} \setminus \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \setminus \mathbb{R}^n \times \{0\} = \mathbb{R}^n \times (\mathbb{R}^m - \{0\}),$$

结合 $\mathbb{R}^m - \{0\} \cong \mathbb{R} \times S^{m-1}$ (球坐标), 即可证明. □

定理 1.3. 十分重要!!! 如果 K 为紧 Hausdorff 空间 X 的闭子集, 则我们有

$$(X \setminus K)^* \cong X/K,$$

如果 K 为局部紧 Hausdorff 空间 X 的闭子集, 则我们有

$$(X \setminus K)^* \cong X^*/K^*,$$

每当我们计算商空间, 或者求一个差空间的一点紧化时, 都应该想到此定理.

Problem 3. 实心球商去边界为同维数的球面, 只是因为

$$\begin{aligned} D^n / \partial D^n &\cong (D^n \setminus \partial D^n)^* \\ &\cong (\mathbb{R}^n)^* \cong S^n, \end{aligned}$$

其中第二个同胚是利用了 n 维开球同胚于 \mathbb{R}^n , 从而一点紧化空间同胚.

Problem 4. 对于 $m > n$, 有

$$(\mathbb{R}^m \setminus \mathbb{R}^n)^* \cong (S^m \setminus S^n)^* = S^m/S^n.$$

Problem 5. 环面将对角线对应的圆周压成一点 ($S^1 \times S^1 / \Delta(S^1 \times S^1)$), 和将一个腰圆压成一点 ($S^1 \times S^1 / 1 \times S^1$) 同胚, 且均同伦等价于 S^2/S^0 .

证明 对前两者同胚的看法是: 画出环面正方形表示, 沿对角线剪开, 再粘上两边, 此时得到的图景就是环面将腰圆压成一点. □

Problem 6. 我们有环面的商空间:

- $S^1 \times S^1 / (1 \times S^1) \cup (S^1 \times 1) = S^2$, 即环面的两个腰圆均压成一点, 会得到球面;
- $S^1 \times S^1 / (1 \times S^1) \cup \Delta(S^1 \times S^1) = S^2$, 即将环面的一个腰圆和一个对角圆压成一点, 也会得到球面.

证明 仍然用正方形表示去看, 注意剪切和粘贴的顺序不会影响最终商空间的同胚型, 从而可以随意操作. □

定义 1.4 (拓扑空间的运算). 设 $X, Y \in \mathbf{Top}$, A, B 分别为其子空间, $x_0 \in X, y_0 \in Y$:

1. *join*: $X * Y := \{tx + (1-t)Y | t \in [0, 1]\}$, 直观想象就是一个四面体, 两个对棱分别代表 X 和 Y , 对任意 t , 切一刀 $X * Y$ 均为 $X \times Y$, 用一个线段表示一个拓扑空间往往会辅助我们想象, 以及构造抽象映射式子;
2. 空间偶的乘积: $(X, A) \times (Y, B) := (X \times Y, (X \times B) \cup (A \times Y))$;
3. 带基点空间的一点并空间: $(X \vee Y, *) := (X, x_0) \vee (Y, y_0) := X \sqcup Y / \{x_0, y_0\}$, 或者看成是 $X \times Y$ 的子空间, $(X \times y_0) \cup (x_0 \times Y)$, 直观想象就以环面和其一维胞腔为例;
4. 带基点空间的压缩积空间: $(X \wedge Y, *) := (X, x_0) \wedge (Y, y_0) := (X \times Y) / (X \vee Y)$, 之所以考虑这个空间, 是因为在带基点的拓扑空间范畴中, 我们需要考虑“空间乘积”, 但由空间偶的乘积, 我们知道 $(X, x_0) \times (Y, y_0) = (X \times Y, (X \times y_0) \cup (x_0 \times Y))$, 不能够自然成为一个带基点的空间, 从而我们需要“把这个多余的空间压成一点”, 结合上一条便可知这个多余空间恰好为一点并。

注 1.5. 在同伦论中, 设 $F(X, Y) := \mathbf{Mor}(X, Y)$, 则有 $F(X \wedge Y, Z) \cong F(X, F(Y, Z))$, 利用这个等式结合回路空间 $\Omega X = F(S^1, X)$ 与 X 约化双角锥空间 $\Sigma X = X \wedge S^1$, 我们有伴随等式

$$F(\Sigma X, Y) = F(X, \Omega Y),$$

同时作用 π_0 , 我们有 $[\Sigma X, Y] = [X, \Omega Y]$, 这里 $[\cdot, \cdot]$ 表示映射同伦类, 由此便可看到压缩积空间的重要性。

定理 1.6. 设空间偶 (X, A) 和 (Y, B) 满足 X 和 Y 均为紧 Hausdorff 空间, A, B 均为闭子空间, 则

$$\boxed{((X \times Y) / ((X \times B) \cup (A \times Y)), *) \cong ((X/A) \wedge (Y/B), *)}.$$

记忆方式. 将压缩积定义中压掉 $X \vee Y$ 换成拓扑空间偶的乘积, 换言之乘积空间商去乘积子空间, 其实就是分别子空间取商再做“乘积”(时刻注意 \mathbf{Top}° 范畴中乘积就是压缩积), 也即“乘积与商可交换”。 \square

Problem 7. 我们有

$$\boxed{S^m * S^n \cong S^{m+n+1}},$$

$$\boxed{S^m \wedge S^n \cong S^{m+n}}.$$

证明 对于第一个，我们可以直接写出同胚等式：

$$f : S^m * S^n \rightarrow S^{m+n+1}, \quad [x, y, t] \mapsto (\sqrt{t}x, \sqrt{1-t}y),$$

这里 x, y 为嵌入欧氏空间的标准坐标。

对于第二个，我们结合 $S^m = D^m / \partial(D^m)$ ，从而

$$S^m \wedge S^n = (D^m / \partial(D^m)) \wedge (D^n / \partial(D^n)) = D^m \times D^n / \partial(D^m \times D^n) = S^{m+n}.$$

其中用到了定理1.6。事实上对于低维我们也可以直接想象，如 $m = n = 1$ ，则可利用问题6，环面压掉两个腰圆即为 S^2 。□

定义 1.7. 拓扑空间 X 的锥空间 $\tilde{C}(X)$ 和双角锥空间 $\tilde{\Sigma}(X)$ 定义为商空间：

$$\begin{aligned} \tilde{C}(X) &:= (X \times I) / (X \times 0), \\ \tilde{\Sigma}(X) &:= \tilde{C}(X) / ([X \times 1]). \end{aligned}$$

带基点的拓扑空间 (X, x_0) 的锥空间 $(C(X), *)$ 和双角锥空间 $(S(X), *)$ 定义为压缩积空间：

$$\begin{aligned} (C(X), *) &:= (X \wedge I, *) \\ (S(X), *) &:= (X \wedge S^1, *). \end{aligned}$$

对于直观想象约化(带基点)情形的锥空间和双角锥空间，就是把原本基点对应的线段 $x_0 \times I$ 压缩成一点即可，比如先画出 $\tilde{\Sigma}(S^1 \vee S^1)$ ，再将中线压成一点，即可得到 $\Sigma(S^1 \vee S^1) = S^2 \vee S^2$ ，而并不是直接去想象和 S^1 的压缩积。

定理 1.8. 十分重要!!! 对于紧 Hausdorff 空间 X 和 Y ，我们有以下结论：

1. $(\tilde{C}(X * Y), X * Y) \cong (\tilde{C}(X), X) \times (\tilde{C}(Y), Y)$;
2. $(\tilde{\Sigma}(X * Y), *) \cong (\tilde{\Sigma}(X) \wedge \tilde{\Sigma}(Y), *)$;
3. $(\tilde{C}(\tilde{\Sigma}(X * Y)), \tilde{\Sigma}(X * Y)) \cong (\tilde{C}(X), X) * (\tilde{C}(Y), Y)$.

注 1.9. 第一条比较好记，第二条就是在第一条的基础上考虑

$$\tilde{\Sigma}(X * Y) = \tilde{C}(X * Y) / (X * Y),$$

然后在用乘积空间偶的商空间等于各自空间偶商空间的压缩积即可。

命题 1.10. 一些相关的结论：

- $(X_1 \vee X_2) \wedge X_3 \cong (X_1 \wedge X_3) \vee (X_2 \wedge X_3)$;

- 局部紧 Hausdorff 空间 X, Y 的一点紧化空间满足 $(X \times Y)^* \cong X^* \wedge Y^*$;
- 局部紧 Hausdorff 空间 X, Y 的一点紧化空间满足 $(X \sqcup Y)^* \cong X^* \vee Y^*$ 。

定义 1.11 (映射锥空间). 映射 $f: X \rightarrow Y$ 的映射锥空间 \tilde{C}_f 定义为

$$\tilde{C}_f(X) := (\tilde{C}(X) \sqcup Y) / \sim$$

其中对任意 $x \in X$, 底盘上的点 $[1, x] \sim f(x)$ 给出等价关系。

2 拓扑空间的同伦型

定理 2.1. 映射的同伦关系满足以下性质：

1. 设 $f_1 \simeq f_2, g_1 \simeq g_2$, 则 $g_1 \circ f_1 \simeq g_2 \circ f_2$;
2. 设 $f_1 \simeq f_2, g_1 \simeq g_2$, 则 $f_1 \times g_1 \simeq f_2 \times g_2, f_1 * g_1 \simeq f_2 * g_2$;
3. 是 $f, g : X \rightarrow Y$ 满足 $f \simeq g$, 则 $\tilde{\Sigma}(f) \simeq \tilde{\Sigma}(g)$, 其中 $\tilde{\Sigma}(h) : \tilde{\Sigma}(X) \rightarrow \tilde{\Sigma}(Y)$ 定义为 $\tilde{\Sigma}(h)[t, x] := [t, h(x)]$ 。

利用上述定理, 我们可以立刻得到:

定理 2.2. 如果拓扑空间 $X_1 \simeq X_2, Y_1 \simeq Y_2$, 则

$$X_1 \times Y_1 \simeq X_2 \times Y_2, \quad X_1 * Y_1 \simeq X_2 * Y_2, \quad \tilde{\Sigma}(X_1) \simeq \tilde{\Sigma}(X_2).$$

一些十分常用的工具是:

定理 2.3. 设 $f, g : X \rightarrow Y$, 则对于映射锥空间 $\tilde{C}_f := (\tilde{C}(X) \sqcup Y) / \sim$, 其中 $[1, x] \sim f(x)$, 我们有如果 $f \simeq g$, 则 $\tilde{C}_f \simeq \tilde{C}_g$ 。

Problem 8. $O(n)$ 为 $GL(n, \mathbb{R})$ 的强形变收缩核。

证明. 由 Gram-Schmidt 正交化, 每一个可逆矩阵都可以唯一写成一个正交矩阵和一个主对角线大于 0 的上三角矩阵的乘积, 记后者为 $T(n)$, 即我们有 $GL(n, \mathbb{R}) = T(n) \times O(n)$, 注意到

$$T(n) \cong \mathbb{R}_+^n \times \mathbb{R}^{1+\dots+(n-1)} \cong \mathbb{R}^{n(n+1)/2},$$

从而可缩, 即证。 □

定理 2.4. 我们有一些好用的性质:

1. 若 A_i 为 X_i 的强形变收缩核, 则 $A_1 \times A_2$ 为 $X_1 \times X_2$ 的强形变收缩核。

利用这个我们可以得到:

- $\mathbb{R}^{m+n} \setminus ((\mathbb{R}^m \times 0) \cup (0 \times \mathbb{R}^n)) = (\mathbb{R}^m \setminus 0) \times (\mathbb{R}^n \setminus 0) \simeq S^{m-1} \times S^{n-1}$;
- $S^m \times S^n \setminus S^m \vee S^n = (S^m \setminus *) \times (S^n \setminus *) \simeq *$.

这类问题要注意观察将给定的形式写成乘积空间。

2. 映射锥空间扣去顶点同伦等价于底空间。

利用这个我们可以得到:

- $S^n \setminus * \simeq *$;
- $(S^m \times S^n) \setminus * \simeq S^m \vee S^n$, 这可以从胞腔粘贴角度看出来是映射锥。

3. $\boxed{\text{join 空间扣去两端中的一端同伦等价于另一端, } (X * Y) \setminus X \simeq Y.}$

利用这个我们可以得到: $S^{m+n} \setminus S^n \simeq S^{m-1}$ 。当然对于这一个, 我们也可以用经典一点紧化的技术, 也即 $S^{m+n} \setminus S^m = (\mathbb{R}^{m+n})^* \setminus (\mathbb{R}^n)^* \cong \mathbb{R}^{m+n} \setminus \mathbb{R}^n = \dots$ 。

4. $\boxed{\text{join 空间扣去两端同伦等价于中间也即乘积空间, } X * Y \setminus (X \sqcup Y) \simeq X \times Y.}$

利用这个可以应用在 S^{m+n+1} 上, 看到高维球面就要想到可以转化成 join 乘积去处理。

Problem 9. 对于映射 $f: X \rightarrow Y$, 我们有 $\tilde{C}_{\{f,f\}} \simeq \tilde{C}_f \vee \tilde{\Sigma}(X)$, 进而将 S^n 的赤道 S^{n-1} 按照对径点粘起来得到的空间同伦等价于 $\mathbb{R}P^n \vee S^n$ 。

定理 2.5. 十分重要!!! 我们有

$$\boxed{(S^n \setminus K)^* \simeq S^n / K \simeq S^n \vee \tilde{S}(K)}.$$

现在对于 \mathbb{R}^n , 若 K 为 \mathbb{R}^n 的非退化 $\boxed{\text{紧}}$ 子空间, 则

$$\boxed{(\mathbb{R}^n \setminus K)^* \cong (\mathbb{R}^n)^* / K^* = S^n / (K \sqcup *) = S^n \vee \tilde{S}(K) \vee S^1},$$

K 为 \mathbb{R}^n 的非退化 $\boxed{\text{无界闭}}$ 子空间, 则

$$\boxed{(\mathbb{R}^n \setminus L)^* \simeq S^n \vee \tilde{S}(L^*)}.$$

定理 2.6. 设 A_i 为 $X_i \setminus B_i$ 的强形变收缩核, 则有

$$(X_1 \times X_2) \setminus (B_1 \times B_2) = ((X_1 \setminus B_1) \times X_2) \cup (X_2 \times (X_2 \setminus B_2)) \simeq (A_1 \times X_2) \cup (X_1 \times A_2).$$

这在考虑补空间的同伦型的时候非常有用。

Problem 10. 对于 $n > m$, 有

$$\mathbb{R}^n \setminus S^m \simeq D^n \setminus \frac{1}{2}S^m \simeq S_+^n \setminus \left(\frac{\sqrt{3}}{2}S^m, 0, \frac{1}{2} \right) \simeq S_+^n \setminus \left(\frac{\sqrt{3}}{2}S^m, 0, -\frac{1}{2} \right) \simeq \boxed{S^{n-1} \vee S^{n-m-1}}.$$

证明 前面四个等价都是同胚意义下的, 要紧的是最后一个, 我们从第二个出发, 注意到 $D^n = D^{m+1} \times D^{n-m-1}$, $\frac{1}{2}S^m = \frac{1}{2}S^m \times 0$, 然后从低维画图即可看出。 \square

定理 2.7. 设 A 为 $X \setminus B$ 的强形变收缩核, 则有

$$\tilde{C}(X) \setminus [\frac{1}{2}, B] \simeq X \cup CA \simeq X/A.$$

证明 证明要点在于, 在很好的条件下, A 为 X 的强形变收缩核蕴含着 A/\sim 为 X/\sim 的强形变收缩核, 从而我们可以交换商和同伦形变的顺序。

因此我们对 $(I \times X) \setminus (\frac{1}{2} \times B)$, 我们有其同伦等价于 $(\{0, 1\} \times X) \cup (I \times A)$, 现在再把上端压成一点, 即可得到 $X \cup CA$. \square

Problem 11. 作为上一定理的推论, 我们有若 A 为 $S^n \setminus B$ 的强形变收缩核, 则 $\mathbb{R}^{n+1} \setminus B \simeq S^n \vee \tilde{S}(A)$, 用这个结论也能很快看出上一题。

特别的, 我们还有

1. $\mathbb{R}^{n+m+2} \setminus ((S^m \times 0) \cup (0 \times S^n)) \simeq S^{n+m+1} \vee \tilde{S}(S^m \times S^n)$;

2. 2.6.10

十分重要!!! 十分重要!!! 十分重要!!! 对于题目 2.6.15, 完全套用定理 2.5 即可, 非常简单, 只要是看到求欧氏空间或者球面补空间的一点紧化空间, 就用定理 2.5!!!

定理 2.8. 扭结补空间的同伦型的求法:

1. 第一步: 写出其平面投影图的结构群;
2. 第二步: 写出节点处重合的关系;
3. 第三步: 化简约化, 注意留下重复的关系, 并记作 1。

Problem 12. 一道难题: 证明 $(S^m)^* \wedge S^n \simeq S^{m+n} \vee S^n$.

证明 首先由压缩积的定义, $(S^m)^* \wedge S^n = ((S^m \times S^n) \sqcup (* \times S^n)) / ((S^m \times *) \cup (* \times *) \cup (* \times S^n))$, 从而可知这实际上就是 $(S^m \times S^n) / (S^m \times *)$, 由胞腔结构, 设 $\psi: S^{m+n-1} \rightarrow S^m \vee S^n$ 表示胞腔粘贴映射, 现在设 $j: S^m \vee S^n \rightarrow S^n$ 表示将 S^m 压成一点的商映射, 从而 $(S^m \times S^n) / (S^m \times *)$ 的胞腔结构为 D^{m+n} 的边界 S^{m+n-1} 按照 $j\psi$ 粘贴到 S^n 上。

又注意到设 $i: S^m \vee S^n \rightarrow S^m \times S^n$ 为嵌入映射, $p: S^m \times S^n \rightarrow S^n$ 为投影映射, 从而 $j = pi$, 又注意到 $i\psi: S^{m+n-1} \rightarrow S^m \times S^n$ 零伦, 因为这相当于是 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{i} C_f$, 从而可知 $j\psi = pi\psi$ 零伦, 因此同伦等价于 $S^{m+n} \vee S^n$. \square

3 同调计算——泛系数定理

定理 3.1 (泛系数定理). 对任意拓扑空间 X , $n \in \mathbb{N}$, 以及 $Abel$ 群 G , 我们有

1. 整系数同调群计算一般系数同调群:

$$H_n(X; G) \cong (H_n(X) \otimes G) \oplus \text{Tor}(H_{n-1}(X), G);$$

2. 整系数上同调群计算一般系数上同调群:

$$H^n(X; G) \cong (H^n(X) \otimes G) \oplus \text{Tor}(H^{n+1}(X), G);$$

3. (经常用) 整系数同调群计算一般系数上同调群:

$$H^n(X; G) \cong \text{Hom}(H_n(X), G) \oplus \text{Ext}(H_{n-1}(X), G).$$

4. (更常用) 设闭流形 M 的同调群满足 $H_k(M) = F_k \oplus T_k$ 为自由与挠部分解, 则

$$H^{n-k}(M) \cong F_k \oplus T_{k-1}.$$

3.1 张量积与 Tor 的运算

关于张量积的运算, 绝大多数时候直接看生成元即可, 如

1. $\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}_m$;

2. $\mathbb{Z}_m \otimes \mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}_{(m,n)}$, 这里 $\mathbb{Z}_1 = \mathbb{Z}/\mathbb{Z} = 0$. 考虑生成元 $1_m \otimes 1_n$, 从而一方面设 $(m, n) = pm + qn$, 则 $(m, n) \cdot (1_m \otimes 1_n) = 0$, 另一方面任意小于 (m, n) 的无法零化 $1_m \otimes 1_n$, 从而可知命题成立;

3. $\mathbb{Z} \otimes G = G$ 对任意 $Abel$ 群 G 均成立, 从而 $\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Q} = \mathbb{Q}$, $\mathbb{Z} \otimes \mathbb{R} = \mathbb{R}$;

4. $G \otimes \mathbb{Q} = G^F$, 即张量积上一个域会去掉 torsion 的部分, 只留下自由的部分.

定义 3.2 (Tor 的定义). 设 $B = F_1/F_2$, 这里 F_1 为自由 $Abel$ 群, F_2 为 F_1 的子群 (从而也为自由 $Abel$ 群), 对于 $F_2 \xrightarrow{i} F_1$ 自然的嵌入映射, 我们记

$$\text{Tor}(A, B) := \ker \left(A \otimes F_2 \xrightarrow{1 \otimes i} A \otimes F_1 \right).$$

注意到利用基本的代数知识可以证明, Tor 不依赖于 F_1, F_2 的选取, 所以我们在具体计算时往往会选取一组最显然与直观的, 我们有如下性质:

1. $\text{Tor}(A, B) = \text{Tor}(B, A)$, 这并不平凡, 但心理上易于接受;

2. $\text{Tor}(A, B) = 0$, 如果 A, B 有一者为自由 $Abel$ 群;

3. $\text{Tor}(\mathbb{Z}_m, \mathbb{Z}_n) = \mathbb{Z}_m \otimes \mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}_{(m,n)}$, 设 $a_m \otimes nk$ 送过去为 0, 说明 $a_m \otimes nk$ 在 $\mathbb{Z}_m \otimes \mathbb{Z}$ 中为 0,

4 同调计算——单纯同调与胞腔同调

计算 $T(x_1, x_2, \dots, x_k; r_1, \dots, r_m)$ 的同调群, 非常简单, 将 r_i 写成一, 做初等变换, 最后划归成对角矩阵, 然后看这个东西的 **Im**, 看最高阶同调群就是 **ker**, 就是最后零行的数目。

单纯同调群就是先根据商关系写出单纯链复形, 然后再算, 注意: 粘贴成同一点的并不意味着对应连线为 0。